



DEO OPTIMO MAXIMO
UNI ET TRINO,
VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ,
Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICO-CHIRURGICA;
QUOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBUS,
manè discutienda, in Scholis Medicorum, die Jovis decimo-septimo
mensis Februarii, anno M. DCC. LII.

M. MICHAËLE-LUDOVICO VERNAGE;
Censore Regio, Doctore Medico, Præsidente.

Utrum in inveteratis ulceribus, remediis internis potius quàm externis, instituenda curatio?

I.



UMORUM in calidos & frigidos antiqua distributio horum quatuor
constituit species; Phlegmonem scilicet, erisipelas, œdema, & scbirrum,
ad quas omnes alii tumores, quotquot sint, reduci possunt. Id sanè, ut
jam in internis affectibus fecimus, (a) externos quoque in classes redu-
cendos esse morbos evinceret. At luculentius nullibi constat, quàm
in ipsâ ulcerum historiâ; nec utiliùs, cùm indè felicior & securior
ulcerum subsequatur eventus. Antiqua porrò debent ulcera in eandem reduci classes

(a) Vide Theo-
sim, an mor-
bos in classes
reducere expe-
diant?

A

ac morbi interni, si hæc ab iisdem solidorum fluidorumque producantur ac foveantur vitiis. Eo sic argumento nostra comprobatur conclusio; & quidem si ulcera ab eadem quâ morbi interni causâ foveri probaverimus, tunc certè remediis potiùs internis insiſtendum esse quàm externis demonstratum erit.

Ulcus est solutio continui in partibus mollibus cum deperditione substantiæ, à pure aut simili causâ excitata.

Multiplies verò sunt ulcerum species. 1^o. Durationis ratione, Recentia, Inveterata. 2^o. Indolis respectu, Simplicia, Complicata, Benigna, Maligna. 3^o. Puris aut materiæ effusæ respectu, Serosa, seu Rheumatica, Saniosa, Ichorosa, Verminosa, Putrida, Fætida, &c. 4^o. Ratione causæ, præter memoratas modò denominationes, Strumosa, Venerea, Scorbutica, Cancrosa dicuntur. Cæteras ulcerum subdivisiones apud egregios qui de Chirurgiâ scripserunt Medicos quisque legere poterit.

Inter ulcerum causas, internæ sunt aliæ, aliæ externæ. Cum de inveteratis hîc tantum agatur ulceribus ab humorum depravatione fatis, de horum causis solum agemus.

1^o. Ulcera dantur quæ à viscidiori sanguine tenaciorique lymphâ foveantur.

2^o. Aliæ quæ à sanguine suscitantur cujus partes, nimiam præter spissitudinem, malè sunt elaboratæ, inter se malè permixtæ, præprimis serum sanguinis, quod præcopiâ vasa quæcumque nimis humectat, & emollit, in quo proinde casu nimia est solidorum laxitas.

3^o. Dantur quæ à sicco nimis sanguine & paulò acri, necnon à nimia vasorum cuiusque generis tensione & irrisibilitate procreantur.

4^o. Quæ à sanguine acriori & aliquatenus corrodente producantur.

Tandem ulcera dantur quæ à quopiam foveantur *virtu*, inter quæ contumacia & inveterata sæpè sæpius occurrunt. Juvat autem animadvertere antiqua dari ulcera à generali fluidorum labe nequaquam fota, sed tantum à perversâ curatione & per decidentiam antiqua facta; cum citissimè à perito curata fuissent Medico. Dantur similiter quæ ab ossis fragmentis, similibusve suam ducunt pertinaciam, nequaquam autem à fluidorum labe; nam vitio locali reparato, statim vel mox quasi spontè curantur.

I I.

IN ulceribus primæ classis nimia spissitudine sanguineam donari molem, ex ipso pure, ex ipso ulcere, & ex ipsâ curandi methodo fatis evincitur. Spissius quidem, & tenacius est pus. Parvâ datur copiâ. Effluit difficilè, ulcerum oris tenaciter adhærens. Nequè interim quantum ad colorem odoremve ullo alio pus contaminari vitio videtur. Carnosæ ulceris mamillares prominentiæ satis non sunt expansiles & teneræ; ut distendi & elongari valeant, nimis verò duræ, firmæ & compactæ sunt carnes, atque licet benè coloratæ, tamen nonnisi tardigradè erumpunt & procedunt. Duriuscula sunt nimisque compacta ulceris labra, & ut plurimum callosa; unde licet è primâ facie neque sordidum, neque mali moris videatur ulcus, obstinatè subsistit. Sæpè sæpius nulla sit cicatrix, vel imperfecta, inæqualis, tumida, fædam referens faciem, quasi exsiccatum citò fuisset potiùs quàm consolidatum, vel ab exsiccante potenter balsamo, absque incarnatione, promptius in ipso exortu occlusum fuisset.

Præstantiora in eo casu incassum adhibentur topica. Eorum ope licet carnea puncta generentur & ipsum pus aliquatenus corrigatur, momentanea foret restitutio. Subsequentibus enim deligationibus & pus & carnes ejusdem naturæ emergerent; quia suâ semper labe inquinatus sanguis, ejusdem iadolis materiam puris suppeditat. Ea ergo san-

guinis labes prius erit emendanda, id est sanguis attenuari & incidi debet. Hunc autem præstant effectum aperientia interius assumpta methodicè, nunc pleniori dosi, nunc diluentibus appropriatis ritè sociata; hoc est ad primam classẽ nostram iste reduci debet æger (a). Instituta sic ulceris curatione, nullã sæpius aliã adhibitã operã spontè succedit suppuratio. Ulcus interim lintei fasciolã simpliciter obducitur, ut ab aeris externi impressionibus sit pars immunis. Interdum callositates lapsu temporis spontè evanescunt, sed ut frequentius accidit, si internis obstant remediis, tunc & per externa procedendum. Citò eas ope ferri destruere & rescindere convenientius erit. Quo peracto, naturæ & remediis internis totum committi debet opus, agendo, quantum ad topica, quasi simplex esset ulcus, ipsum singulis diebus unã aut alterã vice detergendo. Suppurationis enim opus retardant frequentiores deligationes, vel ob aerem, vel ob affricus & titillationes punctorum carneorum. In hoc itaque casu ulcus ablucere melius esset sed mollior & cautè ope aquarum thermalium, inter quas præstant *aqua baregiana*, & *bellilucana*, aut ipsarum loco, vel rubrum vinum, vel cui ad mediam partem additur aqua, vel ex hyperico, persicariã, aristolochiã decoctum simplex, nunc addito melle; vel si carnes aliquantulum emollire opus fuerit, aquã simpliciter tepidã utendum. Si autem suppuratorium applicare sit necessum, quod vulgò, *digestivum* audit, præstantius est; vel quandoque sufficit emplastri de mucilagine applicatio. Si à ferro æger abhorreat, callositatum tentanda resolutio ope aquarum baregianarum sub balnei localis formã vel *duché*, vel embrocationis, vel injectionis, quibus aliquandò contrà omnem spem callositates resolvuntur. Vel mitia tentari possunt corrosiva, ut alumenustum, præcipitata, &c.

(a) Vide The-
sim cit.

I I I.

MEMORATAM in secundo casu fluidorum diathesim, in secundæ classis ulceribus adesse, ex ipso non solum ægri habitu, signisque huic classi propriis, (a) sed ex ulcere, & remedium applicatione statim evincitur. Ulcus enim humidum est, molle, vulgò *baveux*. Molles sunt carnes, decolores, pallentes, evanidæ, inæquales, flaccidæ, fungosæ. Subhumida sunt ulceris labia, & vix renitentia. Copiosum adest pus, sed inæqualis consistentiæ, serosum magis quàm coctum, ita ut serum inæqualiter spissum referat. Oedematosa sæpè sunt ulceris confinia. Citò nunc crescunt carnes, sed evanidæ semper & fungosæ; nunc per aliquot dies sine causâ evidenti subsistunt. Nunc per dies, sed rariùs, satis vegetum diceres ulcus, spissiori & minùs humido pure, vegetioribus tunc paulòque firmis datis carnibus. At in sequentibus deligationibus omnia depravantur. Nunc quidem arescit ulcus, livescit, tunc de aliquali calore acri conqueruntur ægri, & de pruritu. Nunc levissimã de causâ, aut spontè paulò post hæc mutantur, iterumque ut suprà sit ulcus. In hoc ulcere tædiosam esse deterfionem, & nonnisi difficillimè cicatrice ulcus obduci constat, quæ si temporis lapsu fiat cicatrix, mollis semper erit, parùm firma, levi de causâ dilaceranda.

(a) Vide The-
sim cit.

Hoc in casu topica crederes applicanda, ad firmandas carnes molliores, ad superfluas erodendas, & puri consistentiam conciliandi causã. Sed istiusmodi tunc topicorum applicatio temeraria erit & vana; quia etiamsi exoptatus conciliaretur effectus, spontè paulò post ut antea recrudesceret ulcus. Brevi quidem tempore molles & pallentes evanescerent carnes, imò si siccescere, seque meliùs habere videretur ulcus, tunc sedulò caveas; alia enim ipso ulcere periculofiora imminet mala. Ab omni autem topico cautius est abstinere, sed fasciolæ ope ulcus simpliciter obtegere, spontaneam

veluti aliqualem instituendo deterfionem, omnia adstringentiâ, omnia activa detergentia & exsiccantia cautè vitando. Si enim in inveteratis istiusmodi ulceribus cicatrix citò fiat, tunc, non datâ portâ, in nobiliorem irrueret partem sanguinis excrementum, summoque cum ægri discrimine magis atque magis inquinaretur sanguis. Nisi aliud ergo quam medicamina interna præscribendum erit, quibus mitigetur sanguinis labes, tandemque destruat; hoc est ut in secundâ classe tractandus æger, & parî modo, ac si interno afficeretur morbo, putâ hydropico. Hinc ei purgantia pluries præscribenda, diaphoretica, sudorifica, diuretica calida inter quæ balneo mariæ præparata jussula, quibus aperientia adduntur appropriata, & potissimum millepedes. Tunc ut ita dicam, negligi quantum ad topica & in oblivionem duci debet ulcus; quâ enim proportionem sanguinis destruitur labes, eâdem, nullo applicato topico, de die in diem reviviscit & convalescit ulcus.

Porro si post methodicum remedium usum, vel ex ipso ægri habitu, vel ex ulceris facie observaverit Medicus sanguinis immutari diathesim, ad topica tunc devenire poterit, non neglectis interim medicaminibus internis. Præstantiora autem topica ea sunt quæ in primâ classe indicavimus, quia remedium internorum ope è secundâ classe in primam partim immutatus fuit æger. Porro si vitium adhuc locale subsistat, id est si sit vasorum laxitas, ut instituat promptius deterfio & cicatrificatio, ipsaque firma cicatrix enascatur, corroborantia in auxilium advocanda erunt topica, & quæ aliquantulum exsiccant, ut sunt aquæ præsertim bellilucanæ in quibus rubræ decoquantur rosæ, vel utitur vino meraco, vel ad magis exsiccandum aquâ calcis, vel Brianconensis cretæ decocto, vel simili absorbente bolo; at sedulo caveas ne citius exsiccetur ulcus. Ad superfluas fungosâsque carnes absumendas levia adhibentur corrosiva. Notari autem interest, curato ulcere, cathartica interdum esse præscribenda, & diuretica ac aperientia per dies aliquot esse continuanda subsequenter saltem mensibus; aliquatenus enim contaminari sanguinem suspicandum est, ac proinde quâ proportionem superstes evolvitur labes, eâ debet evacuari. Id evincunt ea quæ diximus aliâs de vi quam sese multiplicandi habent miasmata (a), ac de inspilatione & iniquatione sanguinis ab excrementis. Hinc non sibi confidunt clinici, nisi quando per interna remedia curationem instituerunt, cæteris vix, aut nullatenus adhibitis.

(a) Vide The-
sim, an effe-
ctus sex rerum
non natura-
lium ad qua-
tuor præcipua
possum reduci
capite 1

I V.

IN tertiæ classis ulceribus pus erit ut in primâ classe, sed calidum magis & acre; aliquando non admodum albicans. Aridum nunc ulcus erit. Rubræ sunt carnes nimisque rutilantes, sicæ sæpè & nimis tensæ, calidæ, firmæ. Sæpius inflammantur ulceris ora & arefcunt. Conqueritur æger de ardore, de tensione, de mordaci pruritu per intervalla, de tensivo nunc dolore, nunc pungente, imò interdum, per momenta, lancinante, quando præcipuè, vel animi pathemate, vel aliâ de causâ exagitur: anxietates sæpè, insomnia, motus spasmodicos, levesque fremitus, imò convulsiones patitur. Si topicis fiat cicatrix, subhumida erit, inæqualis, exsiccata potius quam incarnatio, quæ per intervalla acutè dolet, sed lento ut plurimum gradu carnes emergunt, & in cicatricis puncto hiulcum remanet ulcus sæpius fistulosum.

Hic ab externis non instituenda est cura. Primò sanguini concilianda est fluxilitas, debent solida laxari, hoc est, agendum erit ut in tertiâ morborum internorum classe;

(b) ergo diluentia, laxantia, & leviter edulcorantia in usum sunt adhibenda; dome-

(b) Vide The-
sim, an mor-
bi in classis,
etc.

stica nimirum balnea, jufcula ex pullis gallinaceis, ex vitulina carne, ex ranarum cruribus, &c. serum lactis, asinum lac. Pluries & pro viribus ægri instituenda erit venæsectio. Aquarum ope mineralium acidularum purgandus est æger. Ad levia nunc deveniendum narcotica, Topica quidem sunt in eo casu applicanda, sed ea tantummodò quæ laxant, emolliunt, & refrigerant.

Nec debet silentio prætermitti, ab ulceris dolore, vel à pruritu dolorifica ita quandoquæ ægros excruciar, ut omni licet topicorum adhibitâ specie, anodyno etiam applicato balsamo, vel ipsâ laudani adhibitâ dissolutione, narcoticis interim magnâ dosi præscriptis, non possit compesci dolor, tantaque à stimulis enascatur febris, ut in ipsâ parte sit gangrenæ metus, vel præ doloribus convulsus mox pereat æger. In hoc ancipiti casu, nullum æquè efficax aliud esse remedium, quàm in calidis bellilucanis partem immergi, docuit experientia pluries repetita. Summâ cum admiratione hunc aliquandò observavimus effectum, cujus quidem licet non statim deducatur ratio, (quia è sale marino præsertim, juxta analysim chemicam, constant aquæ bellilucanæ, proindeque incallescens & irritans sint remedium) res quocumque modo fiat, certa nihilominus est observatio. Primus hoc scripsit *illust. Chiracius* in suo de vulneribus opere. Id in erysipelatodeo brachii ulcere MonsPELLii observaverat, quo à pluribus jam mensibus atrociter adèd cruciabatur mulier, ut aliis licet cujuscumque generis applicatis topicis, & assumpto ad grana plura laudano, non posset conciliari somnus, neque dolor compesci, atque biliosum præcipuè propter temperamentum & melancolicum convulsionibus afficeretur. Hæc desperata mulier, incisus Medicis & Chirurgis, brachium sponte suâ in aquis bellilucanis ad caloris naturalis gradum calefactis immerfit circiter per semihoram, quo balnei tempore, quasi divinitus, pacato indulsit somno. Die sequenti D. D. *Chirac* & *Rideux* Medici ordinarii, & D. D. de la *Peyronie* & *Baranci* ordinarii Chirurgi, totâ facie in meliorem notam mutatum fuisse ulcus omnes mirati sunt; undè ægram an aliud quid fecisset interrogantibus, se proprio motu brachium in aquis bellilucanis immerfisse respondit. Cùm hi præstantissimi Medici & Chirurgi adhucdum hæsitarent, an aquis bellilucanis, an verò narcoticis, inopinatus iste tribuendus esset effectus, ut hæc die & subsequenti nocte abstineret à laudano suadent. At iterum ut præcedentibus diebus, imò crudeliùs recrudescente dolore, brachii immersionem jubent. Ut præcedenti die successit res, eâ solâ operâ conciliabatur somnus, undè effectum in bellilucanas aquas refundere non dubitarunt; attamen publici juris rem facere noluerunt, quin in alio saltem casu confirmata fuisset. *

In quartæ classis ulceribus, cùm à caco chymo sanguine foveatur ulcus, anomalas præbet varietates. Nunc est copiosum pus, nunc parcum, sed inæqualis semper consistentiæ. Nunc sub formâ spissioris feri, nunc diluti, nunc ichoris, fanei, virulentæ magis quàm purulentæ irrorante materiâ. Variosque fortitur colores, nunc viride, luteum, nunc variegatum, ferè semper fatidum, ita ut æger ipse & adstantes nauseant & evomant. Præterea pus mordicans est & acre. Inæquales sunt carnes, subtrudunt in quibusdam punctis & fungosæ, in aliis quasi erosæ, nimis nunc rutilantes, nunc pallidæ, lividæ, sæpiùs & ichorosæ. Ulceris labia nunc inflammantur, nunc livefeunt,

Hæc hujus observationis omnes circumstantias à D. *Rideux*, Regio MonsPELLiensi Professori, acceptum.

* Partem immergendo in aquis, quæ in octaviâ præstant, quæque nuncupantur *les eaux de la Maloûe*, quid simile, sed non ita efficaciter producit. Virtute suâ ad aquas *barégianas*, sed paulò debiliori accedunt. Minus verò resolvunt, sed magis emolliunt. Dolores com-

pesunt, & ut à pluribus agris fuit nobis relaturn, somnum conciliandi propriâ & quasi specificâ vi gaudent; cum, integro quident balneo, plures qui, invitis narcoticis, agrypnia laborabant, prima post balnea placidè dormierunt.

nunc durefcunt. Confinia erifipelatodea fapè funt, & vifû horrendum eft ulcus. Licet ea *cicatrifari* videantur ulcera, fpontè paulò poft, aut levi de causâ, fapiùs iterum recrudescunt; lentâ fapè febre depalcitur ager, & in dies miferè in tabem ducitur..

Vana magis & temeraria adhuc efferet topicorum refolventium & exficcantium applicatio; fed quæ in tertiâ & quartâ indicavimus claffe (a) citò funt præfcribenda. Pro omni viftu ad lac, fi fieri poteft, deveniendum, cui in curationis decurfu Judaici aut Canadenfis balfami guttulæ aliquot ad consolidandum ulcus addi debent. Curato ulcere lac præcipuè alinum debet continuari, Jufcula ex teftudinibus confecta hic multùm profunt. Cùm imbecilles fapè fint ægri vires, balnea & venæ fectiones cautè adhibeantur Debent applicari topica quæ puris acredinem mitigant, talia funt decocta ex plantis malvaceis, ex folano, &c. Nutritum ex folani fucco & ex liquore faturnino confectum, varique plumbi præparata, aquæ Baregianæ & Plomberianæ multùm commendantur; quibus fi refiftat ulcus, à quodam foveri viru, vel à Strumofò, vel à Venereo, vel à Scorbuto fufpicandum eft. Quo deſtructo, ut in fimplici ulcere agendum eft. Si eò ufque evehatur acrimonia ut vera fanguinis fubfequatur diffolutio, tunc fimili modo agendum,

Hæc enim fanguinis partium diffolutio vel ab ipfâ generali fluidorum acrimoniâ, vel à miasmatis purulentis fanguineam intrâ maffam abſorptis exoritur; undè requeſe abraduntur & confumuntur mucilaginoſæ fanguinis partes, quibus debita hujufce fluidi ſervatur confiftentia; vel harum defectu, fatis flexiles & plicatiles non funt fanguinis præfertimque chyli partes, ut in hanc, vel in aliam molem ſefe mutò adunent. Similem aliquandò veram dari diffolutionem non negaverimus; cùm miasmaticâ labe fanguis inquinari poſſit, quâ verè in alias minores refolvatur molleculas; cùm ſimiles à menſtruis ſolutiones nobis paſſim obſiciat chemia; cùmque reverà, in pluribus variolarum ſpeciebus fanguinem diſſolvi, ut & in colligativis morbis, jamdudum peritiſſimi exiſtiment Clinici. Sed notandum ſpuriam fapè diffolutionem pro verâ accipi, hoc eſt partium aſſimilationis defectum; in quo quidem caſu, totus fermè ſub laticis aquei formâ fanguis apparet. Nam, ut alibi diximus, tunc hæmatoſeos eſt defectus, non à fanguinis partium acredine, ſed à debiliiori vaſorum oſcillatione, ac proindè in ſeroſum laticem, nedùm in verum fanguinem totus ferè mutatur chylus, ut in Chloreticis & Hydropicis obſervare datur. Id debet eò lubentiùs obſervari, quòd dum à tali pſeudo-diſſolutione pendent ulcera, non ut in quartâ claffe, ſed ut in ſecundâ tractari debeant; tunc enim per corroborantia, non verò per diluentia opitulandum erit.

„ Denique dici vix poteſt, *inquit Heiſterus*, (a) quantum ad implenda & glutinanda ulcera proficere ſolet prudens vitæ viſtûſque ratio; obſervatum enim jam pridem ab artis ſalutaris Profeſſoribus eſt, ejus beneficio peſſima quandoque ulcera ſine aliis ferè remediis fapè ſanata fuiſſe, contrâ verò ſine ipſâ, vel leviſſima etiam ulcera in peſſima, imò in vitium aliquod inſanabile, haud rarò degeneraſſe. Igitur cavendum ſoleriſſimè ſemper eſt, ne dum ab ulceribus aliquis infeſtatur; cibos acriores falſos, acidos, nimis pingues, aut calefacientes, ſuiſſos, digeſtus difficilioreſ, vel nimioſ etiam adſumat... quòd ſi autem malis fortè corporis habitus obſtare videtur quominùs ſaneſcere ulcus aliquod poſſit, in conſilium utique adhiberi Medicus aliquis prudens debet, qui per adhibita medicamenta interna vitio illi contrario opportuè provideat, ne ulcera mitiora in pejora, vel penitùs quoque inſanabilia tranſeant, ſed ut potiùs curatio horum aptique viſtûſ beneſicio, quantum fieri poſſit, promoveatur,

(a) Vide Theſim citat.

(a) Chirurg. part. r. lib. 4. cap. 1. de ulceribus pag. 333.

EX prædictis patet 1°. Quàm perperam per sola externa tentetur *ulcerum curatio*. Nam præterquamquòd sapiùs sit vana hæc agendi ratio, si fortè sanescant ulcera, periculosiора mox subsequuntur pathemata, affectus putà soporosi, phthisis, motus convulsivi in ipso sæpè exsiccationis momento excitati, qui è medio tollunt ægrum, Idèò de veterum ulcerum curatione non gloriantur clinici, nisi pluribus jam elapsis mensibus. Patet 2°. Complures morbos excitari lethales, qui quidem ab ulceribus intempestivè sanatis ortum habent; hinc in arte magistri iterùm excitare ulcera, vel admoto cauterio ad cutim attrahere labem omni tunc ope tentant. Non obijciatur nostram juxtà methòdum tardiùs ulcera curari, quæ topicorum ope citiùs curari possunt. Respondeo quidem 1°. Per interna sapiùs quàm per externa promptiùs hæc curari ulcera; 2°. Tutò semper per interna & sine recidivà.

At inquires, licet generalis sit labes, potest depurari sanguis vegetà & abundantè institutà suppuratione, & eò quidem faciliùs quòd aliqualis sit analogia inter pus ulceris, & inter partes puris quæ sanguini immiscetur, & quia simile quid in suppurationibus criticis occurrit. Respondeo hoc reverà concipi, & in hunc finem sæpè copiosam per topica institutam fuisse suppurationem; sed quàm rarò felix fuerit eventus palàm constat, dum interna neglecta fuerunt remedia; tunc imò in tabem sæpè ducitur æger; prætereà si eo modo curare Medicus intendat, interna sanè multùm profunt remedia.

Sunt quidem qui ad ulcera inveterata, & ad curandos tumores, corrosivorum applicationem ut per se efficacem suadent & adhibent. Sed ne quid nimis! Præterquàm enim quòd talis aliquandò usus tumorem in cancrum, vel in carcinomatodea mutet ulcera, doloribus ita sæpè excruciat ægros, ut in lentas decedant febres. Prætereà dum ægros curasse putant, aliquot post menses apertà cicatrice recrudescit ulcus, vel in alià parte, vel factà in viscera metastasi, periculosior exoritur morbus, nisi adhibitis internis præcaveatur remediis. In omni tamen casu corrosivorum applicationem absolutè noluerimus damnare, cùm nobis corrosiva præstare possit chemia, quæ non ita ægros excrucient, quæque quasi specificè dicantur operari: sed tot & tantoperè decantatis non indulgeamus arcanis, non leviterque Medicina confidat, nisi prudens & sagax hæc administret Medicus.

At instas, per interna sæpè non curantur ulcera, ac proindè resorpto in massam sanguineam pure, magis ac magis inquinatur. . . . Scrupulosè vitandum ne ulcus cicatrifetur, dum labes nondùm destruitur, sed apertum ulcus servare tutius est; id enim abstergendo, si non omnino, ex maximà saltem parte puris præcaveatur absorptio.

In fistulosis saltem ulceribus, inquires, topica in usum vocari debent. . . . Hoc in ipso casu ab internis semper inchoandum remediis, saltem quantum ægri permittit status; postèa enim ad topica vel ad operationem tutiùs devenitur; alioquin quantumcumquè bellè instituat operatio, ad tumulum sæpè propriùs ægrum duci observare est. Quoad autem ulcera quæ à locali simpliciter vitio foveantur, nullà datà labe, interna aliquantulum continuata remedia haud sanè nocent, denique per externa opitulandum, sed semper caveas, nam ut plurimùm à labe fovetur ulcus quod in inveterata jam degeneravit, & in quo evidentes & manifestæ non deteguntur causæ; unde prudentius erit concludere:

Ergò in inveteratis ulceribus, internis potiùs quàm externis remediis, instituenda curatio.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

*M. Ludovicus-Gabriel Dupré. M. Pascasius Borie.**M. Joannes-Baptista-Thomas
Martineng, Exdecanus &
Academia Censor.**M. Antonius Petit, in Ma-
tronarum gratiam Anato-
mies & Artis Obstetriciæ
Professor, nec non Chirur-
giæ Professor designatus.**M. Florentius-Carolus Bellet,
Scholarum Professor.**M. Franciscus Pouffe.**M. Stephanus Pourfour du
Petit.**M. Ludovicus Patbist.**M. Camillus Falconet, Salu-
bris Consilii Regii Socinus,
& è Regiâ Numismatum
Academia.*

Proponebat Parisiis HONORATUS PETIOT, Sabulonensis, Doctor Medicus
Monspelienſis, Saluberrimæ Facultatis Medicinæ Pariſienſis Baccalaureus, Theſeos
Author, A. R. S. H. 1752, A SEXTA AD MERIDIEM.